

- 本產品以在日本國內進行銷售及使用為目的，是經過日本有關確保醫藥品、醫療器械等的質量、有效性及安全性的相關法律認可的醫藥品。
- 多語種產品資料是根據該產品的日文說明書翻譯而成的，僅供參考。該資料並不保證所記載的內容及該產品本身符合日本以外國家的法律法規。
- 多語種產品資料由提供方（或本公司）臨時翻譯而成，未來可能不提前告知即進行修改或更改。
- 由於多語種產品資料的內容所引起的問題，提供方（或本公司）概不負擔一切責任。

服用時請務必詳閱本說明書。此外，請妥善保管本說明書以方便於必要時取讀。

ピシヤット®

PISHUT止瀉OD錠

第②類醫藥品
止瀉藥

特點

- PISHUT止瀉OD錠的鹽酸樂必寧直接作用於腸道以抑制蠕動，它是透過抑制腸道內的水分分泌，改善腹瀉的藥物。
- 本藥劑為即使在沒有水的情況下也能在口中自然溶解的口腔內崩解錠（OD錠），因此在任何地方都可以輕鬆服用，有效緩解上班、上學途中或會議中等的突然腹瀉症狀。
- 因暴飲暴食或睡覺著涼引起的腹瀉，建議1次1錠見效的PISHUT止瀉OD錠。

⚠ [使用時的注意事項]

禁止事項 ☒

（若不遵守禁止事項，目前的症狀可能會惡化、或者容易產生副作用或發生事故。）

1. 有下列情況者禁止服用。
 - (1) 曾因本藥劑或本藥劑的成分引起過敏症狀者
 - (2) 未滿15歲兒童
 - (3) 苯丙酮尿症的患者
（本藥劑含有L-苯基丙氨酸化合物）
2. 服用本藥劑期間，請勿服用以下藥物。
腸胃鎮痛解痙藥
3. 服用後，請勿開車騎車或操作駕駛機具。
（可能有睡意困倦等情形）
4. 服用前後，請勿喝酒。

諮詢事項 🗣

1. 有下列情況者服用前請向醫師、藥劑師或登錄販賣者諮詢。
 - (1) 正在接受醫師治療者
 - (2) 腹瀉伴隨發燒者，有血便者或黏液便持續者
 - (3) 患有急性嚴重腹瀉，或腹瀉伴隨腹痛、腹脹、噁心想吐等症狀者
（服用本藥劑止住腹瀉，可能會使症狀惡化）
 - (4) 必須避免便秘的肛門疾病患者
（服用本藥劑可能會導致便秘）
 - (5) 孕婦或可能妊娠者
 - (6) 哺乳期者
 - (7) 高齡者
 - (8) 曾因藥物等引起過敏症狀者
2. 服用後發生以下症狀，有可能是產生副作用，請立即停止服用，並持本說明書向醫師、藥劑師或者登錄販賣者諮詢。

相關部位	症狀
皮膚	發疹、發紅、發癢、浮腫
消化器官	食慾不振、腹痛、噁心想吐、腹脹、便秘、腹部不適、嘔吐
精神神經系統	頭暈

在少數情況下，可能會出現以下嚴重症狀。若有此情形，請立即接受醫師診治。

（請繼續閱讀背面內容）

症狀名稱	症狀
休克 (過敏反應)	服用後立即出現皮膚發癢、蕁麻疹、聲音沙啞、打噴嚏、喉嚨發癢、呼吸困難、心悸、意識模糊等
皮膚黏膜眼睛症候群 (史帝芬強生症候群) 中毒性表皮壞死症	高燒、眼睛充血、眼屎、嘴唇糜爛、喉嚨痛、皮膚大範圍的出發疹或發紅等持續症狀，或急速嚴重惡化
類似腸梗阻症狀 (似腸阻塞症狀)	出現伴隨嚴重腹痛、停止排氣(放屁)、嘔吐、腹脹感的明顯便秘現象

3. 服用後，有可能出現下列症狀。當這些症狀持續或加劇時請停止服用，並持本說明書向醫師、藥劑師或者登錄販賣者諮詢。
便秘、睡意困倦
4. 服用2~3天，症狀仍未改善時，請停止服用，並持本說明書向醫師、藥劑師或者登錄販賣者諮詢。

功能與效果

因暴飲暴食引起的腹瀉或睡覺著涼引起的腹瀉

用法與用量

請溶於口中服用或者以冷水或溫水一起服用下列劑量此外，再次服用時，請間隔4小時以上。另外，若停止腹瀉症狀，請勿再服用。

年齡	1次量	服用次數
成人(15歲以上)	1錠	1天2次
未滿15歲	請勿服用	

<用法與用量的注意事項>

- (1)請務必遵守規定的用法與用量(1次1錠、1天2次)服用。
(2)錠劑的取出方式

如右圖所示，請用指尖用力按壓錠劑PTP模的凸出部分，壓破背面的鋁箔，取出錠劑服用。(若不慎直接吞嚥，可能會引發刺穿食道黏膜等意外事故。)



成分與分量

●本劑每2錠(成人1日量)中含有以下成分。

鹽酸樂必寧：1mg

添加物：D-甘露醇、矽酸鋁鎂、羥丙基纖維素、單寧酸、交聯聚維酮、阿斯巴甜(L-苯基丙氨酸化合物)、檸檬酸水合物、l-薄荷醇、香料、硬脂酸鎂

保管及使用上的注意事項

- (1)請避免陽光直射，保管在陰涼乾燥之處。
(2)請保管在兒童觸碰不到之處。
(3)請勿換裝至其他容器中。
(造成誤服用的原因或品質變異。)
(4)請勿服用過期藥物。

銷售總代理

大幸藥品株式會社

郵遞區號564-0032大阪府吹田市內本町3丁目34番14號

製造銷售商



TeiKa製藥株式會社

富山縣富山市荒川一丁目3番27號